

ตัวทำควบคุมศัตรูพืช

มวนตัวห้ำ



มวนพิฆาต

มวนพิฆาต (*Eocantthecona furcellata*)

ลักษณะ: ลำตัวยาวประมาณ 10 มม. ตัวอ่อนมีสีส้มออกแดง ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลประ: ส่วนหลังเป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดสีน้ำตาลอ่อน บ้างถึง 2 ข้างมีหนามแหลมยื่นออกมา



มวนเพชรฆาต

มวนเพชรฆาต (*Sycanus collaris*)

ลักษณะ: ลำตัวยาว 23-25 มม. ลำตัวสีดำ ด้านข้างและส่วนท้องมีแถบยาวแคบๆ สีส้มออกแดง ส่วนหัวแคบ ปีกส่วนบนสีดำ ปีกส่วนกลางสีส้มออกแดง ปีกส่วนปลายสีน้ำตาลเข้ม

ลักษณะการทำลายเหยื่อ

มวนตัวพิฆาตและมวนเพชรฆาตจะกินหนอนศัตรูพืชโดยใช้ปากเจาะแล้วดูดกินของเหลวภายในตัวหนอนเป็นอาหาร เช่น หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนม้วนใบ หนอนกระทู้หอม หนอนหัวกระโหลก หนอนคืบต่างๆ สามารถทำลายหนอนศัตรูพืชได้ 4-6 ตัว/วัน



กลุ่มไข่มวนเพชรฆาต



ตัวอ่อนมวนพิฆาต

อัตราและวิธีใช้

ปล่อยมวนวัย 3-4 อัตรา 100 ตัว/ไร่ กรณีพบหนอนศัตรูพืชในปริมาณมาก ปล่อยมวนตัวห้ำอัตรา 2,000 ตัว/ไร่

