



แมลงหางหนีบ

Earwig

แมลงหางหนีบเป็นแมลง ที่พบทั่วไปในธรรมชาติ มีทั้งชนิดตัวสีน้ำตาลและตัวสีดำ ทำลายศัตรูพืชโดยการไ้หางหนีบไข่และหนอนขนาดเล็ก กินเป็นอาหาร เช่น หนอนเจาะลำต้น อ้อย หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนกระทู้ หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยอ่อน เป็นต้น

ลักษณะการทำลายเหยื่อ

แมลงหางหนีบ ทำลายเหยื่อที่เป็นตัวหนอนโดยใช้เพนหาง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคีมหนีบลำตัวเหยื่อ แล้วกินเป็นอาหาร มักหลบซ่อนตัวตามซอกกาบใบพืช หรือตามซอกดินที่มีเศษใบไม้ สามารถเสาะหาเหยื่อตามซอกมุมได้ดี ถ้าเป็นเหยื่อขนาดเล็กจะกัดกินโดยตรง ถ้ากินอาหารอ้อมแล้วพบเหยื่อ จะใช้เพนหางหนีบจนเหยื่อตายแล้วทิ้งและไปหนีบเหยื่อตัวใหม่ต่อไป



แมลงหางหนีบกำลังล่าหนอน



แมลงหางหนีบในธรรมชาติ

อัตราและวิธีใช้

ปล่อยแมลงหางหนีบอายุ 1 เดือนขึ้นไป เพื่อควบคุมศัตรูพืช โดยใช้อัตราการปล่อย 100-2,000 ตัว/ไร่ ปล่อย 1-2 ครั้ง/ฤดูปลูก กระจายทั่วแปลงพืช



ปล่อยแมลงหางหนีบ

