



ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืชประจำสัปดาห์

สำนักงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๗ ประจำวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

โรคมัมมี

เดือนเกษตรกรที่ปลูกน้อยหน้า ควรหมั่นสำรวจแปลง อาจพบการทำลายของโรคมัมมี ทำให้ผลน้อยหน้ามีลักษณะจุดดำบนผล จุดขยายตัวอย่างช้าๆ จุดสีดำเข้มและมีขอบแผลชัดเจน เนื้อเยื่อที่เป็นโรคจะแข็งและแตกเนื้อเยื่อที่จะเน่าจะครอบคลุมประมาณครึ่งผล ผลเล็กที่เป็นโรค จะแห้งดำ และติดอยู่กับต้นไม่ร่วงหล่น เชื้อรายังทำให้กิ่งตายจากยอดเกิดกับกิ่งเล็กๆ อาการผลแห้งดำโดยเชื้อราชนิดนี้แสดงลักษณะการเน่าลูกกลมของเนื้อเยื่อ ซึ่งแตกต่างจากผลเน่าดำโดยลักษณะทางสรีระที่ผิดปกติซึ่งเน่าดำทั่วทั้งผล

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lasiodiplodia theobromae

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัด ดังนี้

๑. ตัดแต่ง เผลาทำลายกิ่งและผลที่แห้งตาย
๒. ทำการสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบระบาดควรตัดสินใจใช้สารเคมีพ่นกำจัด ดังนี้
 - คาร์เบนดาซิม ๕๐% WP อัตรา ๑๕-๒๐ กรัม/น้ำ ๒๐ ลิตร
 - อะซ็อกซีสโตรบิน ๒๕% W/V SC อัตรา ๑๐ มล./น้ำ ๒๐ ลิตร
 - เบนโนมิล ๕๐% WP อัตรา ๑๕ กรัม/น้ำ ๒๐ ลิตร

